

**ROZPORZĄDZENIE NR 31...**  
**WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia 22...grudnia..... 2022 r.

**w sprawie zasad utrzymywania drobiu  
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 8a i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135), w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu na terenie:

- 1) powiatu działdowskiego;
- 2) powiatu iławskiego;
- 3) powiatu nowomiejskiego;
- 4) powiatu olsztyńskiego;
- 5) Miasta Olsztyn;
- 6) powiatu ostródzkiego;
- 7) powiatu piskiego;
- 8) Miasta Elbląg;
- 9) powiatu elbląskiego.

**§ 2.** Nakaz określony w § 1 nie ma zastosowania przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i kaczek reprodukcyjnych i rzeźnych pod warunkiem, że:

- 1) gęsi i kaczki utrzymywane są w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych;
- 2) przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg, teren wybiegu jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250m zostały uprzednio przeszukane, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - gęsi i kaczki nie są wypuszczane na wybieg oraz niezwłocznie poinformowano właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI;
- 3) przed każdym wypuszczeniem gęsi i kaczek teren wybiegu odkażono przy użyciu środka dezynfekcyjnego;
- 4) na wybiegu stosowano ściółkę pochodzącą z miejsca, w którym składowana była w sposób skutecznie zabezpieczony przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe - wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

- 5) teren wybiegu dla gęsi i kaczek zaopatrzone w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);
- 6) gęsi i kaczki wypuszczane są na wybieg w określonych godzinach w ciągu dnia - między godz. 10:00 a 16:00;
- 7) w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka) uniemożliwia się gęsiom i kaczkom dostęp do nich;
- 8) gęsi i kaczki nie są pojone i karmione na wybiegu.

§ 3. Zakazuje się na terenie określonym w § 1:

- 1) stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek;
- 2) utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu;
- 3) organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1, 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierzam Warmińsko – Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Iławie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Piszczu oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Elblągu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego i Miasta Olsztyn, ostródzkiego, piskiego, elbląskiego i Miasta Elbląg i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
*Artur Cholecki*

## UZASADNIENIE

do projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.).

Wysoco zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze. W związku z faktem, iż w miesiącu grudniu w całym kraju, w tym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI u drobiu, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się tej choroby u drobiu. W okresie od 7 do 18 grudnia br. wykryto 9 ognisk u drobiu: 3 w województwie opolskim, 1 w woj. kujawsko – pomorskim, 1 w woj. mazowieckim, 1 w woj. lubelskim, 1 w woj. łódzkim i 2 w woj. warmińsko – mazurskim. Od 1 grudnia stwierdzono również 6 ognisk HPAI u ptaków dzikich w woj. kujawsko – pomorskim, opolskim i pomorskim oraz 1 u ptaków utrzymywanych w niewoli w woj. pomorskim.

Jednym ze środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się grypy ptaków jest wydanie w drodze właściwych miejscowo rozporządzeń niezbędnych zakazów i nakazów dotyczących zasad utrzymywania drobiu.

Z PR. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Ryszard Steniuc*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



## WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki i gęsi. Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Należy jednak pamiętać, że do zakażenia może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany na zewnątrz drób będzie korzystał z tych samych siedlisk co ptaki wolno żyjące, ponieważ wprowadzenie do gospodarstwa słomy albo zielonki zanieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus może być przyczyną zachorowania. Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka nie tylko utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, ale należy też właściwie zabezpieczać słomę pod szczelnym przykryciem.

Jeśli jednak wirus znajdzie się w gospodarstwie, może ulec dalszemu rozwleczeniu przez człowieka na butach, odzieży czy środkach transportu. Właściciel drobiu powinien zawsze pamiętać o tym, że każda choroba charakteryzuje się tzw. „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w gospodarstwie, ale ptaki, chociaż same wyglądają zdrowo, wydalają już wirusa do otoczenia. Dlatego do obsługi ptaków należy zawsze wykorzystywać oddzielną odzież wierzchnią i buty, w których nie wolno wychodzić poza teren obiektu, w którym znajdują się ptaki. Pewną rolę w pojawianiu się nowych ognisk choroby może odgrywać wiatr, ale raczej na krótkie odległości (150-200 metrów)

(na podstawie informacji ze strony internetowej PIWet PIB w Puławach: <https://www.piwet.pulawy.pl/komunikaty/3>).


W związku z aktualną sytuacją w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie **hodowcy drobiu powinni podjąć wszelkie działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia ww. wirusem, a w szczególności:**

1. nie poić drobiu wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
2. zabezpieczyć znajdujące się na terenie gospodarstwa zbiorniki wodne przed dostępem ptaków wolno żyjących;
3. utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
4. przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
5. karmić i poić drób w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
6. lokalizować gniazda dla drobiu wewnątrz budynków;
7. nie wnosić i nie wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany

- drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
8. wyłożyć przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków (albo zastosować w gospodarstwie inne rozwiązania techniczne pozwalające na oczyszczenie i odkażenie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich) oraz wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z niego (albo zainstalować w gospodarstwie niecki dezynfekcyjne lub inne urządzenia zapewniające dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających) - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego;
  9. stosować przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku oraz oczyszczać i dezynfekować obuwie;
  10. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie;
  11. wdrożyć procedury w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
  12. utrzymywać czystość i porządek wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza i ściółka, w tym regularnie wykaszac roślinność i uprzątać pozostałości pasz i ściółki.


**Hodowcy muszą pamiętać**, że zarówno oni, jak i personel na fermach, jeżeli nie będą przestrzegać zasad bioasekuracji, mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do obiektów, w których utrzymywany jest drób. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania jest ściśle przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Posiadacz drobiu w przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów, tj. zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezdolność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.



Więcej informacji na [www.krd-ig.com.pl](http://www.krd-ig.com.pl)


### GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestry działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek niesności oraz objawy nerwowe (porażenie, skrzęty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**

